

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения
КОРВАЛОЛ

Регистрационный номер: P N002312/01

Торговое название препарата: Корвалол

Лекарственная форма: капли для приема внутрь.

Состав на 100 мл

Активные вещества:

Этилбромизовалерианат 2,0 г

Фенобарбитал 1,826 г

Мяты перечной масло 0,142 г

Вспомогательные вещества:

Спирт этиловый 95 % (этанол) 79 мл

Натрия гидроксид 0,022 г

(натрия гидроокись)

Вода очищенная до 100 мл

Описание: Прозрачная бесцветная жидкость со специфическим ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: седативное средство.

Код АТХ: [N05CM].

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат. Фенобарбитал обладает седативным и мягким снотворным эффектами. Способствует снижению возбуждения ЦНС и облегчает наступление сна. Этилбромизовалерианат оказывает седативное и спазмолитическое действие. Масло мяты перечной обладает рефлекторной сосудорасширяющей и спазмолитической активностью.

Показания к применению

Корвалол назначают в качестве успокаивающего и сосудорасширяющего средства при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы, при неврозоподобных состояниях, сопровождающихся повышенной раздражительностью, нарушенном засыпании, тахикардии, состоянии возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями, а в качестве спазмолитического средства - при спазмах кишечника.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; выраженные нарушения функции почек и/или печени, беременность, период лактации.

Способ применения и дозы

Дозировка устанавливается индивидуально. Взрослым назначают обычно по 15-30 капель 3 раза в день до еды. При тахикардии возможно увеличение разовой дозы до 40-50 капель.

Детям назначают по 3-15 капель в сутки в зависимости от возраста и клинической картины заболевания.

Длительность применения препарата устанавливается индивидуально врачом.

Побочное действие

Корвалол, как правило, хорошо переносится. В отдельных случаях, в дневные часы может наблюдаться сонливость и легкое головокружение, аллергические реакции, снижение концентрации внимания.

При длительном применении больших доз возможно развитие хронического отравления бромом, проявлениями которого бывают: депрессивное настроение, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушение координации движений, лекарственная зависимость.

Особые указания

Препарат содержит 75 объемных процентов этанола и фенобарбитал, поэтому пациентам, принимающим корвалол, не рекомендуется заниматься деятельностью, связанной с повышенным вниманием и требующей быстроты психических и двигательных реакций.

Форма выпуска

Капли для приема внутрь.

15, 25, 30, 40, 45 или 50 мл во флаконе-капельнице из оранжевого стекла.

Флакон-капельница вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать после даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта.

Наименование и адрес производителя/организация, принимающая претензии

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", 305022, Россия, г.Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18,
тел./факс (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru